



 Pr Kyleena[®]
LEVONORGESTREL-RELEASING INTRAUTERINE SYSTEM (19,5 MG)




KYLEENA[®]

کے بارے میں معلومات
حاصل کریں

آپ کے رحم کے اندر لگائے
جانے والے مانع حمل
سے متعلق ایک ہدایت نامہ



باکس میں کیا ہے؟



باکس کے اندر صرف **KYLEENA®** ہی نہیں -
بلکہ اس میں **EvoInserter®** بھی ہے (جسے **KYLEENA®** کو اندر ڈالنے
کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)۔

KYLEENA® کے ساتھ آغاز

KYLEENA® رحم کے اندر لگایا جانے والا ایک سسٹم (IUS) ہے جو 5 سالوں تک کے لیے حمل کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



ایسے کلینک کا پتہ لگانے کے لیے جہاں آپ KYLEENA® کو کسی صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے لگوا سکتی ہوں،
kyleenaandmirena.ca ملاحظہ کریں۔



KYLEENA® پر ایک قریبی نگاہ

- چھوٹا، سفید، T کی شکل کی باڈی
- ملائم، لچکدار پلاسٹک سے بنا ہوا
- عمودی بازو ایک تنگ، سلنڈر نما دوا کے ذخیرہ سے گھرا ہوتا ہے جس میں لیونورجیسٹرل نامی ہارمون ہوتا ہے
- عمودی تنے میں ایک سلور رنگ ہوتی ہے جو افقی بازوؤں کے قریب ہوتی ہے، جو الٹراساؤنڈ میں نظر آتی ہے



KYLEENA® کس قدر مؤثر ہے؟

طبی آزمائشوں میں پایا گیا تھا کہ KYLEENA® استعمال کرنے والی ہر 100 خواتین میں فی سال 1 سے کم کو حمل ٹھہرا ہے۔

ضبط ولادت کے مختلف طریقے استعمال کرنے اور ضبط ولادت کا کوئی طریقہ نہ استعمال کرنے کی حالتوں کا موازنہ کرنے پر عمومی حمل کی شرحیں


استعمال کے پہلے سال میں فی 100 خواتین میں رپورٹ کیے گئے حمل	پروٹیکٹ
1 سے کم	ہارمونل انٹرایوٹرین سسٹم (IUS)
1 سے کم	کاپر انٹرایوٹرین ڈیوائس (IUD)
1 سے کم	جلد کے نیچے مائع حمل رکھنا
6	پروجیسٹیرون انجیکشن
9	مشترک ہارمونل مائع حمل دوا (گولی، پیچ یا چھلا)
12	ڈایافرام
18	مردانہ کنڈوم
21	زنانہ کنڈوم
28-12	اسپینج، اسپر میسانڈ
22	عزل کا طریقہ
24	فطری فیملی پلاننگ
85	کوئی ضبط ولادت نہیں



KYLEENA® کو رحم کے اندر رکھا جاتا ہے

KYLEENA® کو:

- ایک صحت نگہداشت فراہم کنندہ کے ذریعہ رحم کے اندر رکھا جاتا ہے
- لیونورجیسٹرل کی تھوڑی تھوڑی مقدار روزانہ رحم میں براہ راست دھیرے دھیرے خارج کرتے ہوئے کام کرتا ہے
- اس میں کوئی ایسٹروجن نہیں ہوتا ہے




KYLEENA® استعمال کرنے کے دوران، حمل کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تاہم، اگر آپ KYLEENA® استعمال کرنے کے دوران حاملہ ہو جاتی ہیں تو اس کا زیادہ امکان ہے کہ حمل ایکٹوپک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل رحم میں نہیں ہے۔ ایکٹوپک حمل ایک سنگین حالت ہے۔ اگر آپ کے پیٹ کے نچلے حصہ میں درد ہو، خاص طور پر اگر آپ کو حیض نہ آیا ہو اور/یا غیر متوقع طور پر خون بہہ رہا ہو تو اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ کو فوری طور پر بتائیں۔ یہ ایکٹوپک حمل کی علامات ہو سکتی ہیں۔

KYLEENA® حمل روکنے میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟

KYLEENA® حمل روکنے کے سلسلہ میں متعدد طریقوں سے کام کر سکتا ہے:

1. رحم کی پرت کی معمول کی ماہانہ موٹائی کو کم کرتا ہے
 2. فم رحم کے مخاط کو گاڑھا کرتا ہے، جو فم رحم سے اسپرم کے گزرنے کو مشکل بناتا ہے
 3. اسپرم کی نقل و حرکت اور عمل کو خراب کرتا ہے
- یہ افعال حمل کو روکنے کے ذریعے کے طور پر باہم مل کر اسپرم اور بیضہ کو رابطہ میں آنے سے روکتے ہیں۔



اسے لگانے کے دوران کس چیز کی توقع رکھیں

KYLEENA® آپ کے صحت نگہداشت فراہم کنندہ کے ذریعہ رحم میں لگایا جاتا ہے۔ اس عمل میں چند منٹ لگتے ہیں۔

- KYLEENA® کو لگانے جانے سے پہلے، آپ کا ڈاکٹر آپ کے رحم کی پوزیشن اور حجم کا تعین کرنے کے لیے پیڑو کا ایک معائنہ انجام دے گا؛ ضروری ہونے پر وہ پیپ اسمیئر اور چھاتی کا معائنہ اور اسی طرح دیگر جانچیں (مثلاً انفیکشنز بشمول STIs کے لیے) بھی کر سکتے ہیں
- KYLEENA® کی حامل ایک پتلی لچکدار پلاسٹک ٹیوب آپ کے رحم میں ڈالی جائے گی - آپ کو کچھ بے آرامی محسوس ہو سکتی ہے
- صحیح جگہ پر پہنچ جانے پر آپ کا صحت نگہداشت فراہم کنندہ ٹیوب کو نکال لے گا، اور KYLEENA® کو آپ کے رحم میں چھوڑ دے گا
- آخر میں، آلہ کو ہٹانے کے لیے استعمال ہونے والے دھاگوں کو مناسب لمبائی میں کاٹ دیا جائے گا

KYLEENA® لگائے جانے کے دوران اکثر خواتین کو یا تو بالکل بھی نہیں یا ہلکا درد ہوتا ہے۔ کچھ خواتین کو کچھ بے آرامی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ کے ساتھ دردکش دوا یا مقامی طور پر بے حسی کے عمل کی ضرورت پر بات چیت کر سکتی ہیں۔

کچھ خواتین KYLEENA® لگائے جانے کے بعد چکر محسوس کر سکتی ہیں۔ یہ احساس تھوڑے سے آرام کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لگانے کی وجہ سے مرگی والے مریضوں میں دورہ پڑ سکتا ہے۔ اس کے لگانے کے دوران یا اس کے فوراً بعد آپ کچھ خون بہنے کا بھی سامنا کر سکتی ہیں۔ اس کے لگانے کے بعد آپ حیض کے دوران کے درد جیسی کچھ اینٹھن محسوس کر سکتی ہیں؛ تاہم، یہ عام طور پر کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔

ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن KYLEENA® لگانے کے دوران رحم کی دیوار میں سوراخ ہو سکتا ہے اور آلہ رحم سے باہر آکر وہیں ٹک سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو KYLEENA® کا نکالا جانا ضروری ہے۔

آپ کے منصوبوں میں تبدیلی ہونے کی صورت میں KYLEENA® کو کسی بھی وقت ہٹایا جا سکتا ہے۔ جب آپ کا صحت نگہداشت فراہم کنندہ KYLEENA® ہٹا دے گا تو آپ جلد ہی حاملہ ہونے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ اسے لگانے کے دوران، ہو سکتا ہے کہ KYLEENA® رحم کی دیوار سے لگ جائے یا رحم کی دیوار میں داخل ہو جائے (اس میں سوراخ کر دے)، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو KYLEENA® کا نکالا جانا ضروری ہے۔ رحم میں سوراخ ہونے کا خطرہ چھاتی سے دودھ پلانے والی خواتین میں، اور اس حالت میں زیادہ ہوتا ہے جب KYLEENA® کو زچگی کے بعد 36 ہفتوں تک کے عرصے میں لگایا جائے، اور ان خواتین میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے جن کے رحم کی شکل مختلف ہو یا رحم ایسا ہو کہ ایک جگہ قائم ہو اور پیچھے کی طرف جھکا ہوا ہو۔



KYLEENA® کب لگایا جانا چاہیے؟

KYLEENA® کو آپ کا حیض شروع ہونے کے 7 دنوں کے اندر لگایا جانا چاہیے۔ ایسی صورت میں، کسی بیک-اپ ضبط و ولادت کے طریقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ یقینی ہے کہ آپ حمل سے نہیں ہیں تو KYLEENA® کو آپ کے سائیکل کے دوران کسی دیگر وقت میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔

اگر آپ نے اپنے آخری حیض کے بعد سے غیر محفوظ جماع کیا ہے تو اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ کو بتائیں۔ اگر KYLEENA® کو آپ کا حیض شروع ہونے کے 7 سے زیادہ دن کے بعد لگایا جاتا ہے تو کنڈوم یا ڈیایفرام استعمال کریں، یا اگلے 7 دنوں تک جماع نہ کریں۔ KYLEENA® کو ایمرجنسی ضبط و ولادت کے طریقہ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔

اگر KYLEENA® کو بدل رہے ہوں یا حمل کے بعد لگا رہے ہوں تو:

- کسی موجودہ سسٹم کو نئے سسٹم سے بدلتے وقت، آپ کے حیض کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے
- ولادت کے بعد، رحم کے واپس اپنے نارمل سائز کا ہونے تک انتظار کریں، زچگی کے بعد کم از کم 6 ہفتے تک
- پہلے تین مہینوں میں اسقاط حمل کے بعد، KYLEENA® فوراً لگایا جا سکتا ہے۔ تاہم، اگر اسقاط حمل ابتدائی چار سے چھ مہینوں میں ہو تو، آلہ لگانے کے عمل کو 6 ہفتوں تک یا اس وقت تک مؤخر کیا جانا چاہئے جب تک کہ رحم واپس اپنے نارمل سائز کا نہ ہو جائے۔

اگر KYLEENA® آپ کا حیض شروع ہونے کے 7 دنوں کے اندر لگا دیا جائے تو یہ فوراً کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بے آرامی ہونے کی صورت میں، جماع کرنے سے پہلے 24-48 گھنٹے انتظار کرنا بہتر ہے۔ اگر آلہ کو آپ کا حیض شروع ہونے کے 7 سے زیادہ دن کے بعد لگایا جاتا ہے تو اگلے 7 دنوں تک کنڈوم یا ڈیایفرام استعمال کریں، یا جماع نہ کریں۔

KYLEENA® آپ کے حیض کو کیسے متاثر کر سکتا ہے

ابتدائی 3 تا 6 مہینوں میں، آپ کا حیض بے قاعدہ ہو سکتا ہے اور جریان خون کے دنوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ آپ کے ساتھ بار بار خون کے دھبے یا اندام نہانی سے ہلکے جریان خون کا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس مدت کے دوران کچھ خواتین کو بہت زیادہ یا طویل مدت تک خون بہتا ہے۔ اگر یہ صورت حال برقرار رہے تو اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

مجموعی طور پر، آپ کے لیے ہر مہینہ خون بہنے کی مقدار اور دنوں کی تعداد میں بتدریج کمی کا امکان پایا جاتا ہے۔ کچھ خواتین بالآخر پاتی ہیں کہ ان کے حیض بالکل ہی بند ہو جاتے ہیں۔ ایسا رحم کی پرت پر ہارمون کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خون کے ساتھ رحم کی پرت کی موٹی ہونے کی ماہانہ عام مقدار نہیں بنتی ہے؛ اس لیے، معمول کی حیض کی مدت کے دوران خون آنے کے مقابلے بہت کم خون آتا ہے یا خون نہیں بھی آتا ہے۔ اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انقطاع حیض کی عمر کو پہنچ چکی ہیں یا آپ کو حمل ٹھہر گیا ہے۔



تاہم، اگر آپ کے حیض کی مدت KYLEENA® کے ساتھ باضابطہ رہ رہی ہے اور پھر 6 ہفتے یا اس سے زیادہ عرصہ تک حیض نہیں آتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ حاملہ ہو گئی ہوں۔ آپ کو اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے بات کرنی چاہیے۔

KYLEENA® نکال دیے جانے پر حیض جلد ہی معمول پر آ جاتے ہیں۔

KYLEENA® استعمال کرتے وقت پیڈز کے استعمال کی تجویز دی جاتی ہے۔ آپ پھر بھی روئی کی گدی یا حیض کی پیالیاں استعمال کر سکتی ہیں، تاہم، اس بات کا خیال رکھیں کہ انہیں بدلتے وقت KYLEENA® کے دھاگے کھنچ نہ جائیں۔

یہ جانچ کرنا کہ آیا KYLEENA® اپنی جگہ لگا ہوا ہے

آپ کو KYLEENA® لگوانے کے تقریباً 4 تا 12 ہفتوں بعد، اور پھر دوبارہ 12 مہینوں پر اور پھر سال میں ایک بار اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے اس کی اس وقت تک جانچ کرانی چاہئے جب تک کہ اسے نکال نہ دیا جائے۔

ہر حیض کے بعد یا تقریباً مہینہ میں ایک بار، آپ کو اپنی انگلیوں سے چھو کر یہ جانچ کرنی چاہیے کہ آیا دونوں دھاگے ابھی بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ آپ کا صحت نگہداشت فراہم کنندہ آپ کو ایسا کرنے کا طریقہ دکھا کر سمجھائے گا۔ دھاگوں کو کھینچیں نہیں کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی سے KYLEENA® کو کھینچ کر باہر نکال دیں۔

- اگر آپ دھاگوں کو محسوس نہیں کر سکتی ہیں تو یہ اس چیز کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ KYLEENA® یا تو باہر گر گیا ہے (اخراج) یا رحم میں گھس گیا ہے (سوراخ ہونا)۔ اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے ملیں اور، اس دوران، ضبط ولادت کا کوئی دیگر غیر ہارمون والا طریقہ (جیسے کنڈوم) استعمال کریں۔ اگر آپ خود KYLEENA® کے نچلے سرے کو محسوس کر سکتی ہیں تب بھی آپ کو اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے ملنا چاہیے

KYLEENA® لازمی طور پر نکالے جانے سے پہلے 5 سالوں تک اپنی جگہ پر رہ سکتا ہے۔ آپ کو KYLEENA® لگانے کے بعد اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ کی طرف سے ایک مریض یاددہانی کارڈ موصول ہونا چاہیے۔ یہ کارڈ KYLEENA® نکالے جانے تک اپنے پاس رکھیں اور ہر طبی ایوانٹمنٹ میں اسے اپنے ساتھ لائیں۔

کسی درون رحم سسٹم یا ڈیوائس لگانے کے بعد ابتدائی 3 ہفتوں میں پیڑو کے سنگین انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جسے پیلوک انفلیمیٹری ٹیڈیز (PID) کہا جاتا ہے۔ دیگر معلوم خطرہ کے عوامل میں متعدد جنسی ساتھیوں کا ہونا، کثرت جماع، جنسی عمل سے منتقل ہونے والے انفیکشنز (STIs) اور کم عمری شامل ہیں۔

PID سنگین مسائل کا سبب بن سکتا ہے جیسے استقرار حمل میں دشواری، رحم کے باہر حمل کی نشوونما (ایکٹوپک حمل)، یا پیڑو کا ختم نہ ہونے والا درد۔ PID کا علاج عام طور پر اینٹی بائیوٹکس سے کیا جاتا ہے؛ تاہم، PID کے زیادہ سنگین معاملات میں سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

اگر آپ میں PID کی علامات پائی جاتی ہیں، بشمول زیادہ دنوں تک یا بہت زیادہ مقدار میں جریان خون، اندام نہانی سے سیال کا غیر معمولی اخراج، آپ کے پیٹ کے نچلے حصہ میں درد، جماع میں تکلیف، کپکپی یا بخار - تو اپنے نگہداشت صحت کے فراہم کنندہ کو فوری طور پر بتائیں۔



KYLEENA® کو نکالنا اور بدنا

KYLEENA® کو 5 سال سے زیادہ عرصہ لگا نہیں رہنے دینا چاہیے۔ اگر آپ حاملہ ہونا چاہتی ہیں تو KYLEENA® کو آپ کے صحت نگہداشت فراہم کنندہ کے ذریعہ کسی بھی وقت آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔

اگر آپ نے پچھلے ہفتہ کے دوران جماع کیا تھا تو KYLEENA® کے نکالنے کے بعد ممکن ہے کہ آپ حاملہ ہو جائیں۔ KYLEENA® نکالنے کے فوراً بعد آپ کے حاملہ ہونے کا امکان ہے، اس لیے اگر آپ حاملہ نہیں ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو ضبط ولادت کا کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے لیے ضبط ولادت کے بہترین طریقوں کے بارے میں اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے بات کریں، کیوں کہ حمل کو روکنے کے لیے آپ کے نئے طریقے کو KYLEENA® ہٹانے کے بعد سے 7 دن پہلے شروع کیے جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ہفتہ پہلے جماع کیا ہے تو اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ کو بتائیں۔

KYLEENA® ٹوٹ سکتا ہے، زیادہ تر اس وقت جب اس کو نکالنا مشکل ہو رہا ہو۔ ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے نکالا جانا ضروری ہے۔ ایسا کرنے کے لیے سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

اگر آپ 5 سال کے بعد KYLEENA® کا استعمال جاری رکھنا چاہتی ہیں تو آپ کا صحت نگہداشت فراہم کنندہ پرانا سسٹم نکالنے کے فوراً بعد ایک نیا سسٹم لگا سکتا ہے۔



اگر وہی KYLEENA® سسٹم 5 سال سے زیادہ مدت تک لگا رہنے دیا جاتا ہے تو آپ حاملہ ہو سکتی ہیں۔ نئے سسٹم کو لگانے سے پہلے یہ یقینی بنا لینا چاہئے کہ حمل نہیں ہے۔



KYLEENA® کے ضمنی اثرات کیا ہیں؟

ذیل میں ممکنہ ضمنی اثرات کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ یہ KYLEENA® لگا ہونے کے دوران آپ کو محسوس ہو سکنے والے تمام ضمنی اثرات کی فہرست نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ضمنی اثرات کا سامنا کرتی ہیں جو یہاں درج نہیں ہیں تو اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

- مہاسے/چکنائی والی جلد
- چھاتی میں درد/تکلیف
- متلی
- اندام نہانی سے مادہ کا اخراج
- بال گرنا
- بیضہ دانیوں، فیلوپین ٹیویز یا رحم کا انفیکشن
- IUS کا ٹوٹنا
- بہت زیادہ بال
- چہرے، سینے، پیٹ یا ٹانگوں پر
- حیض میں تکلیف
- بلڈ پریشر کا بڑھ جانا

KYLEENA® کے ضمنی اثرات استعمال کے ابتدائی مہینوں کے دوران زیادہ عام ہیں؛ وہ وقت کے ساتھ بتدریج کم ہو جاتے ہیں۔ سسٹم کے لگانے کے بعد ابتدائی مہینوں کے دوران آپ کے حیض کے جریان خون میں فرق KYLEENA® کے سب سے عام ضمنی اثرات ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ اثرات کم ہونے چاہئیں۔

زچگی کے بعد KYLEENA® استعمال کرنے والی کچھ خواتین نے دودھ کی کم پیداوار کی اطلاع دی ہے۔

سنگین انتباہات اور احتیاطی تدابیر – اور ان کے بارے میں کیا کریں، اس سے متعلق تفصیلات کے لیے KYLEENA® کی دوا سے متعلق معلومات برائے مریض ورقچہ ملاحظہ کریں۔

KYLEENA® سے متعلق دیگر چیزیں جن کا علم ہونا

چاہئے

کیا جماع کے دوران KYLEENA® کی موجودگی کا احساس ہو گا؟

جماع کے دوران، آپ یا آپ کے ساتھی کو KYLEENA® کی موجودگی کا احساس نہیں ہونا چاہئے۔

KYLEENA® لگائے جانے کے بعد، جماع کرنے سے پہلے 24-48 گھنٹے انتظار کرنے کی تجویز دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو KYLEENA® کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، یا اگر آپ کو کوئی درد محسوس ہوتا ہے تو اس وقت تک جماع کرنے سے پرہیز کریں جب تک کہ آپ کا صحت نگہداشت فراہم کنندہ یہ جانچ نہ کر لے کہ آیا KYLEENA® ابھی بھی صحیح جگہ پر ہے۔ نکالنے والے دھاگے جماع کے دوران آپ کے ساتھی کے ذریعہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔

کیا KYLEENA® نکل کر گر سکتا ہے؟

اگرچہ اس کا امکان کم ہوتا ہے، تاہم KYLEENA® خود سے باہر گر سکتا ہے۔ KYLEENA® آپ کے حیض کے دوران کلی یا جزوی طور پر باہر نکل سکتا ہے۔ اسے اخراج کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا اگر حیض میں زیادہ خون آنے کی آپ کی سرگزشت رہی ہے تو ایسا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ اگر KYLEENA® اپنی جگہ سے باہر نکل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ توقع کے مطابق کام نہ کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ حمل سے محفوظ نہیں رہ جاتی ہیں۔

آلہ کے اخراج کی کچھ علامات درد اور غیر معمولی جریان خون ہیں۔

KYLEENA® اس طرح بھی باہر آ سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے۔ آپ کے حیض کے دوران جریان خون کی مقدار میں غیر معمولی اضافہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ ایسا ہو گیا ہے۔

اگر آپ سمجھتی ہیں کہ KYLEENA® باہر آ گیا ہے (کلی یا جزوی طور پر) تو جب تک آپ اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے مل نہ لیں اس وقت تک جماع سے پرہیز کریں یا ضبط ولادت کا کوئی دیگر نان-ہارمونل طریقہ استعمال کریں، جیسے کہ کنڈوم یا ڈایافرام۔ وہ اس بات کی تصدیق کے لیے الٹراساؤنڈ اور ایکسری کر سکتے ہیں کہ آیا یہ باہر گر گیا ہے۔ KYLEENA® اگر جزوی طور پر باہر نکل گیا ہو تو اسے ہٹا دیا جانا چاہیے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ حمل نہیں ہے تو KYLEENA® کو بدل کر نیا لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کا صحت نگہداشت فراہم کنندہ آپ کے لیے بہترین چیز کا فیصلہ کرے گا۔

KYLEENNA® کی حیض سے متعلق ڈائری

ابتدائی چند مہینوں میں خون کے دھبے یا جریان خون کے واقعات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے KYLEENNA® کی حیض سے متعلق ڈائری استعمال کریں۔

دن	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1 ماہ																																		
2 ماہ																																		
3 ماہ																																		
4 ماہ																																		
5 ماہ																																		
6 ماہ																																		

بدايات برائے مريض

درج ذیل بدايات نامہ کا استعمال کرتے ہوئے، کلیٹر کے موزوں خانے (نن) کو نشان زد کر کے اپنے حیض کے خون کے بہاؤ یا کسی بھی ایسے جریان خون کو ریکارڈ کریں جو نو حیض کے دوران پیش آئے ہیں۔

- زیادہ بہاؤ – خانہ پُر کریں
- خون کے دھبے – ایک نقطہ بنائیں
- X عام بہاؤ – X نشان زد کریں
- X عام بہاؤ – X نشان زد کریں

KYLEENA® کے بارے میں مزید معلومات کے لیے kyleena.ca ملاحظہ کریں (مکمل رسائی کے لیے، درخواست کیے جانے پر دوا کا شناختی نمبر [DIN] 02459523 درج کریں)۔



اس بروشر کی ایک ڈیجیٹل نقل ڈاؤن لوڈ کرنے یا دیگر زبانوں میں اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کیو آر کوڈ اسکین کریں

KYLEENA® کی باز ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے اپنے بیمہ فراہم کنندہ سے رابطہ کریں۔

سنگین انتباہات اور احتیاطی تدابیر

- بارمونڈل مانع حمل دوائیں بشمول KYLEENA®، جنسی عمل سے منتقل ہونے والے انفیکشنز (STIs) بشمول HIV/AIDS سے تحفظ فراہم نہیں کرتی ہیں۔ خود کو STIs سے محفوظ رکھنے کے لیے، آپ KYLEENA® کے ساتھ کنڈوم استعمال کر سکتی ہیں
- سگریٹ نوشی دل اور خون کی رگوں پر سنگین ضمنی اثرات کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ آپ کو تمباکو نوشی کے خطرات کے بارے میں اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے بات کرنی چاہیے
- KYLEENA® رحم کی دیوار سے منسلک ہو سکتا (جم سکتا) ہے یا اس میں سوراخ کر سکتا ہے۔ اسے پروفوریشن (سوراخ ہونا) کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اندام نہانی سے جریان خون کے ساتھ یا اس کے بغیر پیٹ یا پیڑو میں شدید درد کا سامنا ہوتا ہے تو فوراً اپنے صحت نگہداشت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں

مکمل علامات، مخالف اثرات، انتباہات، احتیاطی تدابیر، ضمنی اثرات اور مریضوں کے انتخاب کے معیار کے لیے برائے مہربانی KYLEENA® کا معلوماتی ورقچہ برائے مریض دیکھیں۔

PP-KYL-CA-0319-1
KYL036U

© 2024, Bayer Inc.
TM® دیکھیں www.bayer.ca/tm-mc

 Kyleena®
LEVONORGESTREL-RELEASING INTRAUTERINE SYSTEM (19.5 MG)


MEMBER OF
INNOVATIVE
MEDICINES
CANADA


B
A
Y
E
R